


ARGUS

Cycle 2008-2009

ARGUS est une enquête sur l'infection par le VIH, les hépatites virales et les infections transmissibles sexuellement (ITS) ainsi que sur les comportements à risques associés chez les hommes québécois ayant des relations sexuelles avec des hommes (HARSAH).



L'enquête ARGUS combine la surveillance des infections (par tests biologiques) et la surveillance des comportements. Elle est répétée à intervalles réguliers afin de suivre l'évolution de la situation. Elle s'inscrit dans le cadre d'un ensemble d'enquêtes utilisant les mêmes variables effectuées auprès des populations HARSAH de différentes villes canadiennes.

Elle est menée sous la responsabilité de la Direction de santé publique de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, de l'Institut national de la santé publique du Québec et de l'Agence de santé publique du Canada, par une équipe formée de représentants de milieux communautaires, de milieux universitaires et de la santé publique.

Tous les HARSAH âgés de 18 ans et plus sont éligibles à participer à l'étude, quel que soit leur statut sérologique face au virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

Des hommes sont approchés dans une grande variété de lieux de socialisation gais (ex. : bars, saunas, cafés, regroupement de sports et loisirs...).

Lors des sessions de recrutement, des enquêteurs s'adressent aux personnes présentes selon un pas d'échantillonnage adapté aux lieux visités (par exemple : une personne sur deux ou une table sur deux). De cette manière, chaque personne a une chance égale de participer à l'étude. L'échantillon constitué peut être considéré comme représentatif des HARSAH qui fréquentent des lieux de sociabilité gais.

Le questionnaire porte notamment sur les caractéristiques sociodémographiques des répondants, la composition de leur réseau social, les lieux publics visités pour faire des rencontres de partenaires sexuels, leurs activités sexuelles, leur consommation d'alcool et de drogues, leurs antécédents de santé et de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) et leurs opinions sur le VIH.

Entre les mois de mai 2008 et mars 2009, 1 873 hommes recrutés dans une quarantaine de lieux ont complété un questionnaire auto-administré; 75 % d'entre eux résidaient sur l'Île de Montréal.

Pratiquement tous les répondants (98,0%) ont aussi fourni quelques gouttelettes de sang afin que puissent être effectuées des analyses de laboratoire pour détecter le VIH, le virus de l'hépatite C et la syphilis.

Le présent document propose un survol des données descriptives de l'étude.

ARGUS 2008 - 2009 - FAITS SAILLANTS

Enquête auprès d'hommes québécois âgés de 18 ans ou plus ayant des relations sexuelles avec des hommes

	n=1873 %
DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES	
Être âgé de moins de 30 ans	24.2
Avoir complété des études secondaires	85.5
Résider sur le territoire de l'île de Montréal	75.0
Disposer d'un revenu annuel avant impôt de 40 000 dollars ou plus	44.1
ORIENTATION SEXUELE ET VIE SOCIALE GAIE	
Se définir comme homosexuel ou gai	89.1
Compter 50% ou plus d'hommes gais comme amis	71.4
Être en union de fait ou marié avec un homme	24.1
Être en couple avec un homme depuis plus de six mois	33.0
Avoir vécu une forme de discrimination (injures, insultes, brimades, harcèlement, rejet, violences physiques, agression sexuelle, etc.) à cause de son orientation sexuelle ou de ses activités sexuelles au cours des six derniers mois	22.7
Avoir vécu un abus sexuel au cours de la vie	20.2
ACTIVITÉS SEXUELLES	
	<i>Parmi l'ensemble des répondants</i>
Relations sexuelles orales ou anales avec un homme au cours des six derniers mois	92.4
Relations sexuelles avec une femme au cours des six derniers mois	16.8
	<i>Parmi les répondants ayant eu des relations sexuelles avec un homme au cours des six derniers mois</i>
Relations sexuelles avec six partenaires sexuels masculins ou plus	44.4
Relations sexuelles avec six partenaires sexuels masculins « d'un soir » ou plus	32.4
Relations sexuelles en « groupe » (relations sexuelles entre trois hommes ou plus en même temps) au moins une fois	33.0
Relations anales avec six partenaires sexuels masculins ou plus	21.3
Relations anales non protégée (sans condom) avec un partenaire masculin au moins une fois	44.5
Relations anales non protégées (sans condom) avec un partenaire masculin « d'un soir » au moins une fois	17.7
Relations anales non protégées (sans condom) « intentionnellement » avec un partenaire « d'un soir » au moins une fois	11.6
Relations anales sans condom au moins une fois avec un partenaire sexuel considéré comme « à risque » : partenaire « d'un soir »; partenaire « occasionnel » ou partenaire « régulier » infecté par le VIH ou dont le statut VIH est inconnu (parmi les répondants non infectés par le VIH ou ne sachant pas leur statut VIH)	31.5
CONTEXTE DE RENCONTRE DE PARTENAIRES SEXUELS	
	<i>Parmi les répondants ayant eu des relations sexuelles avec un homme au cours des six derniers mois</i>
Argent donné en échange de relations sexuelles au moins une fois au cours des six derniers mois	6.2
Argent reçu en échange de relations sexuelles au moins une fois au cours des six derniers mois	5.2
Rencontre d'un nouveau partenaire sexuel dans des bars gais au moins une fois au cours des six derniers mois	42.1
Rencontre d'un nouveau partenaire sexuel dans un sauna au moins une fois au cours des six derniers mois	41.6
Rencontre d'un partenaire sur l'Internet au moins une fois au cours des six derniers mois	35.0
Rencontre d'un nouveau partenaire sexuel dans des endroits publics (parcs, pistes cyclables, etc.) au moins une fois au cours des six derniers mois	22.1
Rencontre d'un nouveau partenaire sexuel dans des « sex clubs » ou dans des bars avec « backroom » au moins une fois au cours des six derniers mois	17.8
Rencontre d'un nouveau partenaire sexuel dans des cafés au moins une fois au cours des six derniers mois	14.4
Rencontre d'un nouveau partenaire sexuel dans un « circuit party » au moins une fois au cours des six derniers mois	8.8
CONSOMMATION D'ALCOOL OU DE DROGUES LORS DES RELATIONS SEXUELLES DES SIX DERNIERS MOIS	
	<i>Parmi les répondants ayant eu des relations sexuelles avec un homme au cours des six derniers mois</i>
Sous l'effet de l'alcool lors des relations sexuelles, la moitié des fois ou plus	16.9
Sous l'effet de la marijuana (pot, hash, herbe) lors des relations sexuelles, la moitié des fois ou plus	9.0
Sous l'effet du nitrite d'amyle (poppers) lors des relations sexuelles, la moitié des fois ou plus	8.3
Sous l'effet de médicaments pour la dysfonction érectile lors des relations sexuelles, la moitié des fois ou plus	4.3
Sous l'effet de la cocaïne (poudre, neige) lors des relations sexuelles, la moitié des fois ou plus	3.6
Sous l'effet de l'ecstasy (MDMA, E) lors des relations sexuelles, la moitié des fois ou plus	2.3
Sous l'effet de gamma - hydroxybutyrate (GHB, GH, G ou Jus) lors des relations sexuelles, la moitié des fois ou plus	2.1
Sous l'effet d'amphétamine lors des relations sexuelles, la moitié des fois ou plus	1.4
Sous l'effet de kétamine (K, Spécial K) lors des relations sexuelles, la moitié des fois ou plus	1.3
Sous l'effet de méthamphétamine (cristal-meth) lors des relations sexuelles, la moitié des fois ou plus	0.4
Sous l'effet de drogues récréatives (champignons ou ecstasy ou kétamine ou poppers ou GHB ou amphétamines ou cristal-meth), la moitié des fois ou plus	11.6

	n=1873 %
HABITUDES GÉNÉRALES DE CONSOMMATION D'ALCOOL ET DE DROGUES	
<i>Parmi l'ensemble des répondants</i>	
Consommation de boissons alcoolisées quatre fois ou plus par semaine au cours des douze derniers mois	21.8
Consommation de cocaïne par voie nasale (sniffée) au moins une fois au cours des six derniers mois	22.0
Consommation de cocaïne par inhalation au moins une fois au cours des six derniers mois	6.9
Consommation de kétamine par voie nasale au moins une fois au cours des six derniers mois	8.7
Injection de drogues (autres que des stéroïdes) au moins une fois au cours des six derniers mois	3.4
Utilisation d'une seringue ou d'une aiguille déjà utilisée par une autre personne au moins une fois au cours des six derniers mois (parmi les répondants ayant consommé des drogues par injection, autres que des stéroïdes, au cours des six derniers mois)	19.0
Injection de stéroïdes au moins une fois au cours des six derniers mois	1.5
RECOURS AUX SERVICES DE SANTÉ ET ANTÉCÉDENTS D'ITSS	
<i>Parmi l'ensemble des répondants</i>	
Consultation d'un médecin pour un bilan général de santé ou pour un bilan ITSS au cours des douze derniers mois	65.5
Connaissance de l'orientation sexuelle par le médecin consulté (parmi les répondants ayant consulté un médecin au cours des douze derniers mois)	88.9
Réception d'un diagnostic d'une infection gonococcique de la part d'un médecin ou d'un(e) infirmier(e) au cours des douze derniers mois	5.4
Réception d'un diagnostic de verrues génitales ou anales de la part d'un médecin ou d'un(e) infirmier(e) au cours des douze derniers mois	3.6
Réception d'un diagnostic de la chlamydie de la part d'un médecin ou d'un(e) infirmier(e) au cours des douze derniers mois	3.6
Réception d'un diagnostic de l'herpès génital ou anal de la part d'un médecin ou d'un(e) infirmier(e) au cours des douze derniers mois	3.7
Test de détection du VIH au cours des douze derniers mois (parmi les répondants qui n'avaient pas déjà eu un test positif avant le début de cette période de 12 mois)	59.3
Test de détection de l'hépatite C au cours des douze derniers mois (parmi les répondants qui n'avaient pas déjà eu un test positif avant le début de cette période de 12 mois)	34.2
Test de détection de la syphilis au cours des douze derniers mois	42.8
RECOURS AUX SERVICES PRÉVENTIFS	
<i>Parmi l'ensemble des répondants</i>	
Réception d'au moins une dose de vaccin contre l'hépatite B au cours de la vie	73.6
Réception de plus d'une dose de vaccin contre l'hépatite B au cours de la vie	50.4
Prise de prophylaxie post-exposition sexuelle au moins une fois au cours de la vie	5.5
Avoir vu une affiche (poster) au sujet de la santé sexuelle, des ITS, du VIH ou du sexe sécuritaire au cours des douze derniers mois	89.6
Avoir lu un feuillet au sujet de la santé sexuelle, des ITS, du VIH ou du sexe sécuritaire au cours des douze derniers mois	74.4
Avoir lu sur l'Internet une information au sujet de la santé sexuelle, des ITS, du VIH ou du sexe sécuritaire au cours des douze derniers mois	53.6
Avoir discuté sur l'Internet avec un intervenant au sujet de la santé sexuelle, des ITS, du VIH au cours des douze derniers mois	9.4
Avoir discuté dans un lieu de rencontre avec un intervenant au sujet de la santé sexuelle, des ITS, du VIH au cours des douze derniers mois	21.6
Avoir participé à une rencontre de groupe animée par un intervenant au sujet de la santé sexuelle, des ITS, du VIH au cours des douze derniers mois	7.4
Avoir participé à une rencontre individuelle (counselling) avec un intervenant au sujet de la santé sexuelle, des ITS, du VIH au cours des douze derniers mois	13.6
Avoir obtenu gratuitement (dans des bars, des saunas, des organismes communautaires, etc.) 90 à 100% des condoms utilisés au cours des six derniers mois (parmi les personnes ayant utilisé un condom au cours des six derniers mois)	38.6
OPINIONS SUR L'INFECTION PAR LE VIH, (ÊTRE «MODÉRÉMENT» OU «TRÈS» D'ACCORD)	
<i>Parmi l'ensemble des répondants</i>	
« Je me sens moins concerné par le fait d'être infecté par le VIH maintenant que de meilleurs médicaments anti-VIH sont disponibles »	9.8
« Un homme infecté par le VIH qui prend des médicaments anti-VIH diminue ses chances de transmettre le VIH »	20.7
« Le VIH/Sida est devenu une maladie contrôlable (comme le diabète) »	26.1
« Je suis fatigué de me faire dire de porter des condoms »	12.4
« Je crois que je suis à risque d'être infecté par le VIH au cours des 6 prochains mois (ou réinfecté si je suis déjà infecté par le VIH) »	14.8
« Les nouvelles thérapies donnent l'impression aux personnes séropositives qu'elles ont moins besoin de mettre le condom »	26.6
« Les médicaments anti-VIH contribuent à un relâchement au niveau des pratiques sécuritaires des personnes séropositives »	39.4
PRÉVALENCE DES ITSS	
Prévalence du VIH	<i>parmi l'ensemble des répondants</i> 13.6
Ignorance de son statut VIH positif	<i>parmi les personnes dont le test VIH lors de l'enquête était positif</i> 14.5
Prévalence du VHC (infection actuelle ou résolue)	<i>parmi les utilisateurs de drogues par injection</i> 30.7
	<i>parmi les non utilisateurs de drogues par injection</i> 1.4
	<i>parmi l'ensemble des répondants</i> 3.8
Prévalence de la syphilis (infection actuelle ou traitée)	<i>parmi l'ensemble des répondants</i> 8.5

Remerciements

L'équipe d'ARGUS tient à remercier tous les hommes qui ont participé à cette étude ainsi que les divers organismes communautaires gais de Montréal qui l'ont soutenu. L'équipe tient aussi à souligner l'aide inestimable des propriétaires et gérants des établissements où s'est déroulé le recrutement des participants.

Ces faits saillants sont extraits de :

G Lambert, J Cox, Y Miangotar, C Tremblay, M Alary, J Otis, R Remis, M McGuire, P Sandstrom et l'équipe M-Track. ARGUS 2008-2009 : Enquête sur l'infection par le VIH, les hépatites virales et les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) ainsi que sur les comportements à risques associés chez les hommes québécois ayant des relations sexuelles avec des hommes. Direction de santé publique Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, Institut national de santé publique du Québec et Agence canadienne de santé publique, 2011.

